

UPUTA ZA ZA ODREĐIVANJE OKULTNOG (NEVIDLJIVOG) KRVARENJA U STOLICI

Priprema bolesnika:

Tri dana (najmanje 48 sati) prije izvođenja testa, bolesnik se mora pridržavati sljedeće dijete:

Hrana koja se smije jesti:

- dobro kuhana svinjetina, piletina, riba
- svo kuhano voće i povrće
- vlaknasta hrana

Hrana i lijekovi koji se ne smiju uzimati:

- crveno meso (govedina, janjetina, iznutrice, krvavice)
- bilo koje sirovo voće i povrće
- vitamin C (više od 250 mg)
- aspirini i drugi nesteroidni protuupalni lijekovi (7 dana prije i za vrijeme izvođenja testa)

Test se ne smije provoditi kod:

- menstruacije i proljeva

Priprema test-kartona za izvođenje testa:

- Na test-kartonu se nalaze dva prozorčića. Na jedan prozorčić nanesite tanki sloj stolice uzet sa štapićem s jednog mjesta, a na drugi prozorčić nanesite tanki sloj stolice uzet s drugim štapićem s drugog mjesta stolice. Tako priređen test-karton zatvorite perforiranim poklopcem i dostavite u laboratorij. Do tada test-karton se čuva na sobnoj temperaturi, zaštićen od svjetla i izvora topline.
- Uzimanje uzorka stolice na pripadni test-karton potrebno je učiniti u tri uzastopna dana, za svaki dan na pripadnom posebnom test-kartonu.